

ក-សំភារៈប្រើប្រាស់

១-ME ដបចំណុះ 10ml និង ថ្នាំពុលសំរាប់លាយដប តូចចំណុះ 01ml

២-ស៊ីរាំងចាក់ថ្នាំចំណុះ 05 ឬ 10ml

៣-មូលសំរាប់ បូមថ្នាំលេខ 18 ឬ 21 (មូលចាក់ថ្នាំ ធម្មតា មិនអាចបូមថ្នាំបានទេ) ។

៤-ស្រោមដៃ

៥-អន្ទាក់ធ្វើពីកំប៉ុងជ័រ ពណ៌សស្រអាប់ ។



ខ-របៀបប្រើប្រាស់

១-យកថ្នាំពុលដបតូច(ចំណុះ01ml)ចាក់ចូលដប ME ចំណុះ 10ml គ្របឱ្យជិតក្រឡុកឱ្យសព្វ ។ អាចប្រើ ME ដោយមិនលាយថ្នាំពុលក៏បាន រុយចូលអន្ទាក់នោះ នឹងងាប់ដោយ ខ្លួនវា ២-៣ ថ្ងៃ បន្ទាប់

២-ប្រើស៊ីរាំង 05ml បំពាក់មូលបូមលេខ ១៨ បូម ថ្នាំពីក្នុងដបចំនួន 01ml (បញ្ជាក់ដើម្បីបូមថ្នាំពីដបបានត្រូវយក ស៊ីរាំងបំពាក់មូលរួច បូមខ្យល់ទទេចំនួន 01ml សិនរួចចាក់មូល

ទំលុះអ្នកដបជ័រចាញ់ខ្យល់ 01ml ចូលក្នុងដប រួចបូមយកថ្នាំ 01ml មកវិញ) ។

៣-បើកគំរូអន្ទាក់យកថ្នាំដែលលាយហើយ 01ml ឬ ME ដោយមិនលាយថ្នាំពុលចំនួន 01ml នោះបាញ់ដាក់ទៅលើ អេប៉ុង ឬ សំឡីក្នុងអន្ទាក់ជ័រនោះ រួចបិទគំរូអន្ទាក់វិញ ។



៤-យកអន្ទាក់នេះទៅព្យួរ នៅលើដើមឈើស៊ុបទ្រុប ចៀសវាង ត្រូវកំដៅថ្ងៃ ដែលធ្វើឱ្យឆាប់បាត់បង់សារជាតិ ME និង ជាតិពុល

៥-លើផ្ទៃចំការ ១០០០ម៉ែត្រការ៉េ អាចប្រើអន្ទាក់ពី ២ ទៅ ៣ ក្រោយពីព្យួរ ៧ ថ្ងៃ ទៅ ២០ថ្ងៃ ត្រូវចាក់រុយចេញ ពីអន្ទាក់ហើយបន្ថែម ME ដែលលាយជាមួយថ្នាំពុល ឬ មិន លាយ 01ml ទៀត ។ ករណីក្នុងចំការ មានរុយចូលច្រើនត្រូវ យកចាក់ចោល ៥-៧ ថ្ងៃម្តង

៦-ដប ME ដែលលាយថ្នាំពុលហើយ អាចទុកបានមិន លើសពី ៦ ខែឡើយ ។



បណ្ឌិតសភា ខេត្តកណ្តាល

រុយលើផ្លែឈើ និងបន្លែប្រូបផ្លែ
(Fruit Fly)



រៀបចំដោយ : ការិយាល័យក្សេត្រសាស្ត្រ និងកែលំអដឹកសិកម្ម

លេខ : ៤ ឆ្នាំ២០០៨

១. ភាពចម្លែក

បច្ចុប្បន្នពពួករុយលើផ្លែឈើ និង បន្លែហូបផ្លែត្រូវបាន ចាត់ទុកជា សត្វល្អិតចង្រៃចំបងក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក អូសេអានី អាហ្វ្រិក អឺរ៉ុប និងអាមេរិក ។

ដោយឡែក នៅប្រទេសកម្ពុជាយើង សង្កេតឃើញ ផ្លែឈើ និងបន្លែហូបផ្លែជាច្រើនមុខរង ការបំផ្លាញដូចជា : ក្រូចគ្រប់ប្រភេទ ជំពូ ត្របែក ទៀប ពុទ្រា ស្វាយគ្រប់ប្រភេទ ល្ងុង មៀន ចេកគ្រប់ប្រភេទ ល្ងុង ផ្លែទឹកដោះ ត្រសក់គ្រប់ប្រភេទ ត្រប់ ត្រឡាច ល្អៅ ននោង...។ ល។ ការបំផ្លាញនេះយើង មិនទាន់មានវិធានការ មានប្រសិទ្ធភាព ទប់ស្កាត់ និង កំចាត់នៅឡើយ ។

២. លក្ខណៈរូបសាស្ត្រ និងជីវិតសាស្ត្រ

ប្រជាកសិករយើង តែងតែហៅថា ស្រាំង រី រុយមាស រី រុយក្បាលស្វា ដោយសំគាល់ពណ៌ភ្លឺៗ ពណ៌មាស រី បៃតងភ្លឺថ្លា។ វដ្តជីវិតរបស់វា មានការវិវត្តពេញលេញ មេ ពង ដង្កូវ ដឹកឡើ ហើយអាយុកាល របស់វាប្រែប្រួលទៅតាម species នីមួយៗ តែជាមធ្យមដង្កូវ អាចរស់នៅក្នុងផ្លែឈើ និង បំផ្លាញផ្លែឈើពី ៧-១៤ ថ្ងៃ ។ សត្វពេញវ័យមិនបំផ្លាញផ្លែឈើទេ ។

៣. វិធានការបង្ការ និងកំចាត់

• វិធានកូតាមអនាម័យ

អនុវត្តបទដ្ឋានបច្ចេកទេស ច្បាប់ជាតិ និងអន្តរជាតិដែល

បាននិងកំពុងធ្វើសុខដុមនីយកម្មក្នុងតំបន់ (ឧទា: ISPMN°1- ISPMN°29) និងអនុក្រឹត្យប្រកាសផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើឡើងស្របទៅនឹង អនុសញ្ញាការពារដំណាំអន្តរជាតិ (IPPC) ។

• វិធានបំប៉ននិងអនាម័យ

-ការបង្ការល្អបំផុតគឺ រុំផ្លែឈើដោយ ក្រដាសកាសែត ឬថង់ ។ ត្រូវសំអាតប្រមូលកាកសំណល់ សំបក ស្លឹក មែកឈើ ឬ ផ្លែឈើដែលស្អុយជ្រុះដុតកំទេចចោល ដើម្បីកាត់ផ្ដាច់វដ្តជីវិត នៃពពួករុយមាស ឬ រុយក្បាលស្វា ។

-យកផ្លែឈើដែល មានស្នាមបំផ្លាញ ដោយដង្កូវរុយ ជ្រមុជត្រាំក្នុងទឹក ៣-៤ ថ្ងៃ ឬ ដាក់ចង់ប្លាស្ទិកខ្មៅបិទជិតហើយ ដាក់ហាលថ្ងៃបន្ទាប់មកយកផ្លែឈើនោះធ្វើជាចំណីសត្វឬបក្សី ។

• វិធានការគីមី

គេអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្ម ដែលមានសារធាតុសកម្ម malathion dimethoate និង fenthion ដោយបាញ់លើ រុក្ខជាតិទាំងមូល និងលើស្លឹក ឬ ផ្លែដែលជ្រុះជុំវិញដើមរុក្ខជាតិ រាល់សប្តាហ៍ ដោយចាប់ផ្ដើម ២សប្តាហ៍ មុននឹងផ្លែឈើបានផល ហើយរហូតដល់ប្រមូលផល ។ ប៉ុន្តែទង្វើបែបនេះធ្វើឱ្យបាត់បង់ សត្រូវធម្មជាតិ របស់រុយមាសចង្រៃ ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នក ហូបផ្លែឈើ និង អាចបន្សល់សំណល់ជាតិពុល លើផ្លែឈើលើស កំរិត MRLs ដែលមិនអាចនាំចេញ ទៅក្រៅប្រទេសបាន ។

• វិធានការជីវសាស្ត្រ (ការប្រើប្រាស់អន្ទាក់ Pheromone ME)

គេប្រើប្រាស់អន្ទាក់ ME នេះ ដើម្បីកាត់បន្ថយ និង

កំចាត់ពពួករុយចង្រៃដែលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដោយរួមផ្សំជាមួយវិធានការដាំដុះ ឬអនាម័យចំការដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ ។



ផលប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់អន្ទាក់ Pheromone

- ចំណាយថវិការតិចនិងចំណេញពេលវេលា
- មានប្រសិទ្ធភាពល្អប្រសើរក្នុងការកាត់បន្ថយដង់ស៊ីតេប្រជាករនៃពពួករុយ លើដំណាំហូបផ្លែ ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ និងហូបចុក
- ធានានូវគុណភាព និងរស់ជាតិផ្លែឈើ និងបន្លែហូបផ្លែ
- មិនប៉ះពាល់ដល់ បរិស្ថានធម្មជាតិ (មិនសំលាប់សត្វមានប្រយោជន៍ដែលជាសត្រូវធម្មជាតិ នៃពពួករុយចង្រៃនេះ)
- ផ្លែឈើ និង បន្លែហូបផ្លែ គ្មានជាតិថ្នាំពុលធានាសុវត្ថិភាពដល់ អ្នកហូបចុក និងតំលៃទីផ្សារក្នុងស្រុក
- អាចនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារសេរីបានដោយ ទំលាយរំលាយបច្ចេកទេស (MRLs and Phyto sanitary requirements) ។